

POINT VIGILANCE N°12 L'hypoglycémie du nouveau né



Les Médecins Conseils Sham ont traité récemment plusieurs dossiers de demande d'indemnisation pour séquelles neurologiques graves attribuées à un retard de diagnostic d'une hypoglycémie néonatale.

L'hypoglycémie néonatale est une situation fréquente et banale au cours des 48 premières heures de vie. Pour l'éviter, les recommandations préconisent :

- un **premier repas dans les 60 min après la naissance**
- puis une **prise alimentaire toutes les 3 h.**

Les signes d'une hypoglycémie sont aspécifiques, tout symptôme compatible doit la faire rechercher. (Référence ci-dessous)

L'hypoglycémie est plus fréquente dans les situations suivantes (liste non exhaustive) : prématurité, macrosomie, asphyxie périnatale, RCIU, nouveau-né de mère diabétique, sous beta bloquant ou avec antécédents familiaux d'hypoglycémie, pathologies néonatales (infection, détresse respiratoire, etc...), anomalie endocrinienne, métabolique, hypothermie, ou chez le nouveau-né présentant des difficultés d'alimentation ou une symptomatologie aspécifique.

Les recommandations préconisent un contrôle glycémique systématique et renouvelé.

Les experts judiciaires ou CCI qui sont intervenus dans nos dossiers ont relevé les éléments suivants (plusieurs dossiers cumulés) :

- Absence de mise en place par l'équipe médicale de protocole systématique précoce de dépistage et surveillance rapprochée chez des nouveau-nés à risque
- Retard de l'alerte par défaut de sensibilisation de l'équipe soignante
- Retard de mise en route d'un traitement
- Absence ou retard de transfert de l'enfant en néonatalogie pour mise en place d'abord veineux centraux (cathéters ombilicaux) pour permettre le passage rapide de solutés adaptés à la gravité de la situation.

Références:

Recommandation de la société française de médecine Périnatale 2013 : « Surveillance des Nouveau-nés à risque d'hypoglycémie : proposition de recommandations de la Coordination Française Pour l'allaitement maternel (CoFAM) » (Bruel H et al et les membres du comité scientifique de la CoFAM : SFMP Monaco 14 nov 2013) Quand détecter une hypoglycémie en maternité et quelle prise en charge ? Archives de Pédiatrie 2014;21:198-199

SHAM & VOUS EN QUELQUES CHIFFRES !



1er assureur en Responsabilité Civile Médicale en France



1er assureur des actes réalisés en plateau technique lourd



+ de 15% de croissance annuelle en RCM sur les professionnels de santé libéraux

Plus qu'un assureur, un partenaire de confiance !



Une équipe dédiée à vos côtés

A chaque étape de la vie de vos contrats et tout au long de la gestion de vos sinistres, bénéficiez d'un interlocuteur direct.



Un partenaire fiable et de proximité

Nous nous engageons au quotidien à vos côtés dans une relation d'échange car mieux vous connaître c'est mieux vous protéger.



Un partenaire engagé auprès des associations professionnelles

Sham entretient des liens forts avec les acteurs majeurs de votre environnement en s'engageant au quotidien à leurs côtés.

[Je découvre Sham](#)

www.sham.fr

Sham traite votre e-mail pour vous adresser, suivant le cas, des informations, des communiqués, des invitations, des convocations, des formulaires, en lien avec les entités du groupe. Pour en savoir plus cliquez [ici](#).

[Si vous ne souhaitez plus recevoir d'email de Sham merci de cliquer sur Désabonner](#)